

# NEORECORMON®

(Aktif içerik epoetin beta (rch) [yeniden birleşici insan eritropoietini] içerir)

## Tüketici İlaç Bilgileri

### Bu broşürde neler var

Bu broşür, NEORECORMON® hakkındaki kimi yaygın soruları yanıtlar.

Var olan tüm bilgileri içermez. Doktorunuzla veya eczacınızla konuşmanızın yerini almaz.

Tüm ilaçların riskleri ve yararları vardır. Doktorunuz NEORECORMON kullanmanızın riskleri ile sizin için olmasını beklediği yararlarını tartmıştır.

**Bu ilacı kullanımına ilişkin endişeleriniz varsa, doktorunuza ve eczacınıza sorun.**

**Bu broşürü ilaçla birlikte saklayın.**

Yeniden okumanız gerekebilir.

### NEORECORMON ne için kullanılır

NEORECORMON, aktif içerik epoetin beta (ee-poe-tin bee-ta şeklinde söylenir) içerir. Epoetin beta ayrıca yeniden birleşici insan eritropoietini olarak da bilinir.

NEORECORMON, hormonlar denilen bir grup ilaca aittir.

NEORECORMON, böbreklerce (küçük bir bölümü de karaciğer tarafından) doğal olarak üretilen ve kemik iliğinde ve dalakdaki alyuvarlar üretimi için uyarıcı görevi yapan hormonlardan birinin benzeridir.

NEORECORMON alyuvarların üretimini artırarak çalışır ve çeşitli kansızlık türlerinin tedavisi için kullanılır.

Kansızlık, vücudun yeterli alyuvarlar üretememesi sorunudur.

Kansızlık, kişinin böbreklerinin hasar görmesi veya çalışmaması durumunda meydana gelebilir. Kişinin böbreklerinin normal çalışması ancak yine de kansızlığının olması durumları da vardır (kimoterapi gören hastalar gibi). NEORECORMON bu diğer durumlar için yararlı olabilir.

NEORECORMON ayrıca, büyük bir ameliyattan önce kişinin kendi kanının bağışlanması ve nakil için depolanması sırasında da kullanılır. Bu, hastanın bir kan bankasından nakil kabul etmesinin gerekli olmaması anlamına gelir.

Ancak doktorunuz, başka bir nedenle de NEORECORMON ilacı verebilir.

**Size niçin NEORECORMON verildiğine ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza sorun.**

NEORECORMON bağımlılık yaratmaz.

Bu ilaç, sadece doktoru reçetesi ile satılır.

### NEORECORMON kullanmadan önce

**Ne zaman kullanmamalısınız**

**Şu koşullarda NEORECORMON kullanmayın:**

- Epoetin beta veya bu broşürün sonunda sıralanan içeriklerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz olmuşsa. Alerjik reaksiyonun belirtileri şişkinlik, kaşıntı, kızarıklık veya nefes alma güçlüğüdür.

- kontrol edilmeyen yüksek tansiyonunuz varsa
- sizde veya bebeğinizde fenilketonüri (genetik metabolik hastalık) varsa. NEORECORMON, aktif olmayan içerik olarak fenilalanin içerir ve riskler hakkında doktorunuza danışmalısınız.
- ameliyattan önce kendi kanınızı bağışlıyorsanız, ve:
  - tedavinizden önceki ay içinde kalp krizi veya felç geçirmişseniz veya
  - yeni veya artab görüs ağrınız varsa, veya
  - damarlarda kan tıkanıklıkları riski taşıyorsanız (derin damarda kan pıhtılaşması) veya daha önce pıhtılaşmalarınız olmuşsa. Bunlardan herhangi biri size uyuyorsa veya uyma olasılığı varsa, hemen doktorunuza söyleyin.
- paket yırtılmışsa veya kurcalanma belirtileri taşıyorsa
- arkada yazılı son kullanma tarihi (EXP) geçmişse. Bu ilacı son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanırsanız, hiç bir etkisi olmayabilir, veya daha kötüsü, beklenmedik bir etkisi olabilir.

**NEORECORMON kullanıp kullanmamakta emin değilseniz, doktorunuzla konuşun.**

### Çocukların kullanımı

NEORECORMON, prematür bebekleri de dahil, çocukların kullanımını için güvenlidir.

## **Kullanmaya başlamanızdan önce**

NEORECORMON kullanmaya başlamanızdan önce doktorunuzun şunların hepsini bilmesi gerekir.

### **Doktorunuza şunları söyleyin:**

- hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. NEORECORMON'un, tedavinin yararları doğmamış bebek için risklerden daha ağır gelmiyorsa, hamile kadınlarda kullanımı genellikle önerilmez
- bebek emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız. Epoetin beta vücutta doğal olarak meydana geldiği için, NEORECORMON'un enjeksiyondan sonra anne sütüne geçip geçmediğini saptayabilmek mümkün olmamıştır. Bebek emziriyorsanız, doktorunuz NEORECORMON kullanmanın risklerini ve yararlarını sizinle görüşecektir
- şunlar da dahil başka bir sağlık sorununuz varsa:
  - kan pıhtılaşması hastalıkları
  - yüksek tansiyon – tansiyonunuzu kontrol altında tutmak için, doktorunuzun, beslenmenize ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, tüm yönergelerine uymak önemlidir
  - kanser
  - sara
  - böbrek hastalığı
  - karaciğer hastalığı
  - herhangi başka bir hastalık veya sağlık sorunu. Vitamin yetersizliği gibi birkaç sorun NEORECORMON'a verdiğiniz tepkiyi etkileyebilir.
- Herhangi başka bir ilaca, yiyeceğe, boyaya veya katkı maddesine karşı alerjileriniz varsa.

### **Diğer ilaçları almak**

**Eczaneden, süpermarketten veya sağlıklı yiyecekler dükkanından aldıklarınız da dahil, kullandığınız herhangi bir ilaç varsa, doktorunuza söyleyin.**

Kimi ilaçlar NEORECORMON'a müdahale edebilir ve çalışmasını etkileyebilir.

NEORECORMON alırken dikkatli olmanız veya kaçınmanız gereken ilaçlar hakkında doktorunuzun veya eczacınızın daha fazla bilgisi vardır.

## **NEORECORMON nasıl kullanılmalıdır**

**Doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız tarafından size verilen tüm yönergelere dikkatle uyun.**

O bilgiler, bu broşürdeki bilgilerden farklı olabilir.

### **Ne kadar enjekte edilmelidir**

Doktorunuz, bireysel gereksiniminize bağlı olarak ne kadar NEORECORMON enjekte edilmesi gerektiğini size söyleyecektir.

Gerekirse, verdiğiniz tepkiye bağlı olarak, dozunun terapi sırasında doktorunuz tarafından değiştirilebilir.

Doktorunuz, sorular sorarak ve zaman zaman laboratuvar testleri yaparak NEORECORMON'a verdiğiniz tepkiyi izleyecektir.

**Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayın veya değiştirmeyin.**

### **Nasıl enjekte edilir**

NEORECORMON deri altından veya damardan enjekte edilerek verilir.

Doktorunuz, enjeksiyonlarınızı evde yapmanın sizin için daha uygun olup olmayacağını sizinle görüşecektir. Bu durumda size veya bir aile bireyinize iğneyi doğru bir şekilde nasıl yapacağımızı konusunda yönerge verilecektir. Bu,

birçok hastanın yeğlediği basit bir işlemdir.

Doktorunuz NEORECORMON'u deri altı enjeksiyonu ile almanızı söylemişse, lütfen aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Doktorunuz NEORECORMON'u size damardan enjeksiyon ile vermeyi kararlaştırmışsa, diyalize girdiğiniz sırada, bir hemşire size tarafından iğne yapılacaktır.

NEORECORMON'u kendi kendilerine enjeksiyon eden hastalara yardımcı olmak için bir hasta destek dosyası vardır. Lütfen bu broşürün sonundaki formu kullanarak kaydolun veya daha fazla bilgi için doktorunuz, sağlık profesyoneliniz veya Roche Tıbbi Bilgilendirme servisi ile ilişkiye geçin (1800 233 950).

It is recommended that the first dose of NEORECORMON be administered by a doctor or nurse.

### **Deri altı enjeksiyonu için yönergeler**

Aşağıdaki yönergeler sadece deri altı enjeksiyonu içindir.

İşlemin her adımına alışmak için bu yönergeleri baştan sonra okumalısınız. Bu yönergeler dikkatle izlenmelidir. Daha fazla yönergeye gereksinim duyarsanız doktorunuza danışın.

Temizliğin yaşamsal olduğunu unutmayın.

### **Kendi kendinize iğne olmaya hazırlık**

Başlamadan önce

1. Ellerinizi iyice yıkayın.
2. Temiz, rahat bir yer bulun.
3. Gereksineneceğiniz tüm tıbbi malzemeyi toplayın:
  - Alkollü bez.
  - Biraz pamuk.
  - İğnenin atılacağı kutu.
4. Önceden NEORECORMON'la doldurulmuş şırıngayı buzdolabından alın. Kullanmadan önce buzdolabı dışında 30 dakika saklayın; veya şırıngayı avuçlarınızda 1

- dakika kadar hafiften ısıtın.  
İlacı sallamamaya dikkat edin.
- Son kullanma tarihini (EXP) kontrol edin.  
NEORECORMON'u, önceden doldurulmuş şırınganın etiketinde gösterilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
  - Sıvının renginin bozulmamış, dumanlanmamış olduğuna veya içinde parçacıklar olmadığına dikkat edin. Sıvı berrak ve renksiz olmalıdır.

### **Şırıngayı ve iğneyi hazırlamak**

- İğnenin paketinden koruyucu kaplamayı çıkarın.
- Şırınganın ucundan lastik başlığı çıkarın.
- İğneyi sağlam bir şekilde şırınganın ucuna yerleştirin.
- İğnenin ucundan koruyucu başlığı çıkarın.
- Şırıngada hava kabarcıkları görürseniz, şırıngayı iğnenin ucu havaya gelecek şekilde tutun, hava kabarcıklarını yukarı getirmek üzere şırıngaya hafifçe vurun. Havayı şırıngadan çıkarmak için pompayı hafifçe içe doğru itmeniz gerekebilir.
- Doktorunuzun verdiği ilaç dozunu kontrol edin.  
Doktorunuzun verdiği dozu yakalamak için bir miktar ilacı atmak üzere pompayı hafifçe itmeniz gerekebilir.
- Şırıngayı (ucunda iğne varken) bir yere koymanız gerekirse, plastil koruyucunun iğneyi kapattığından emin olun ve temiz düz bir yere koyun.
- Şırınga şimdi kullanıma hazırdır.

### **İğne yapılacak yeri seçmek**

- İğne yapılacak yeri karın bölgenizden veya kalçanızın yukarı kısmından seçin.
- Göbek çukurunuzdan veya bel yerinizden kaçının.
- Bir yerde ağrı olmasını önlemek için, iğne yapılan yeri her defasında değiştirin.
- Kızarık veya şişmiş bir yere asla iğne yapmayın.
- NEORECORMON'u asla bir kasa enjekte etmeyin.

### **İğne yapılacak yeri hazırlamak**

- İğne yapılacak yeri alkollü bir bezle temizleyin ve derinin kurummasını (10 saniye süreyle) bekleyin.
- Şırınganın ucundan koruyucu iğne kapağını çıkarın ve şırıngayı iğne yukarıya dönük şekilde tutun.
- Derinizi iğne yapılacak yerden başparmakla işaret parmağınız arasında, yukarı kalkacak şekilde sıkıca kavrayın.

### **İlacı enjekte etmek**

- Şırıngayı derinize 45 derecelik açıyla tutun.
- İğneyi tek hızlı bir hareketle, düz tarafı yukarı gelecek şekilde sokun.
- Pompayı yavaşça gittiği kadar aşağı doğru bastırın.
- Tüm sıvı şırıngadan çıkınca, iğneyi, soktuğunuz açı ile dışarı çekin.
- İğnenin ucunu yeniden kapatmayın.
- Azıcık kanama görürseniz, iğne yapılan yerin üzerine pamukla hafifçe bastırın.

Unutmayın: Birçok kişi kendi kendilerine deri altından iğne yapmayı öğrenebilir, ancak, güçlük yaşarsanız, doktorunuzdan, hemşirenizden veya eczacınızdan yardım ve tavsiye istemekten korkmayın.

### **İğne yaptıktan sonra temizlik**

- İğne ve şırınga sadece tek kez kullanılmalıdır.
- Şırınga ve iğneyi (tek parça halinde), enjeksiyondan sonra derhal keskin maddeler çöpüne atın.
- İğnenin başlığını yenilemeyin.
- Kullanılmış iğneleri ve şırıngaları evinizin normal çöp kutusuna **asla** atmayın.

İğneleri ve şırıngaları nasıl atacağınızdan emin değilseniz, bunu doğru bir şekilde nasıl yapacağınız konusunda doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışın.

### ***NEORECORMON ne zaman enjekte edilmelidir***

Bu ilacı ne sıklıkta kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.

**NEORECORMON'u ne zaman enjekte edeceğiniz konusunda doktorunuzun yönergelerini tamına uygulayın.**

### ***NEORECORMON ne süreyle kullanılmalıdır***

Tedavi süreniz, hastalığınıza bağlı olarak, birkaç haftadan tüm yaşamınızı kapsayacak şekilde uzayabilir.

**Doktorunuz durmanızı söyleyene kadar NEORECORMON kullanmayı sürdürün.**

Tedavinizin ne zaman durması gerektiğini doktorunuz kararlaştıracaktır.

### ***NEORECORMON kullanmayı unutursanız***

**Enjeksiyon zamanınız çok yaklaşmışsa, unuttuğunuz enjeksiyonu atlayın ve ondan sonra kullanmanız gerekeni kullanın. Aksi halde, hatırlar hatırlamaz kullanın ve normal kullanımınıza geri dönün.**

**Unuttuğunuz enjeksiyonun yerine geçmesi için iki enjeksiyon birden kullanmayın.**

Çünkü NEORECORMON uzun sürelerle kullanıldığından, zaman zaman unutulmasının tedaviniz üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmez.

**Ne yapacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorun.**

**İlacınızı ne zaman kullanacağınızı anımsamakta güçlük çekiyorsanız, kimi ipuçları için eczacınıza danışın.**

### ***Çok fazla NEORECORMON kullanırsanız (aşırı doz)***

**Kendinizin veya başka birinin aşırı NEORECORMON kullanmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, rahatsızlık veya zehirlenme belirtileri olmasa da, tavsiye için derhal doktorunuza veya Zehir Bilgilendirme Merkezi'ni (telefon 13 11 26) arayın veya en yakın hastanedeki Kaza ve Acil Durum bölümüne gidin. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir.**

**Bu gibi yerler için telefon numaralarını hemen bulunabilecek yerlerde saklayın.**

## **NEORECORMON kullanırken**

### **Yapmanız gerekenler**

**NEORECORMON'u tam tamına doktorunuzun verdiği ölçüyle kullanın.**

**Sizi tedavi eden tüm doktorlara, dişçilere ve eczacılara, NEORECORMON kullandığınızı söyleyin.**

**Önce doktorunuza söylemeden veya eczacınıza danışmadan, reçeteye verilmiş olsa da olmasa da, başka bir ilaç almayın.**

Tansiyon sorunuz varsa, NEORECORMON kullanırken, tansiyonunuzu kontrol etmek için, beslenmeyle ilgili olanlar da dahil, doktorunuzun yönergelerine uymak önemlidir.

Çoğu kişinin, NEORECORMON kullanırken kandaki demir oranı azalır. Hemen hemen tüm hastaların demirin takviyesiyle tedavi edilmesi gerekecektir.

**NEORECORMON kullanırken hamile kalırsanız, doktorunuza söyleyin.**

**Herhangi bir nedenle NEORECORMON'u tam reçeteye verildiği şekilde kullanmamışsanız doktorunuza söyleyin.**

Aksi halde doktorunuz etkili olmadığını düşünebilir ve gereksiz yere tedavinizi değiştirebilir.

**İlerlemenizin kontrol edilebilmesi için doktorunuzla olan tüm randevulara gittiğinizden emin olun.**

Doktorunuzun sizi düzenli kan testinden geçirmesi gerekecektir.

### **Yapmamanız gerekenler**

**Önce doktorunuza danışmadan NEORECORMON kullanmayı durdurmayın veya dozunu değiştirmeyin.**

**Hafta sonlarında veya tatillerde ilaçsız kalmamaya dikkat edin.**

**Sizinle aynı sorunları olsa bile NEORECORMON'u başkalarına vermeyin.**

**Başka şikayetleri tedavi etmek için, doktorunuz söylemediyse, NEORECORMON kullanmayın.**

**Doktorunuza danışmadan başka epoetin markalarını kullanmayın.**

### **Dikkatli olunması gerekenler**

**NEORECORMON'un sizi nasıl etkileyeceğini bilene kadar taşıt sürerken veya makine çalıştırırken dikkatli olun.**

## **Yan etkiler**

**NEORECORMON kullanırken kendinizi iyi hissetmezseniz doktorunuza veya eczacınıza söyleyin.**

NEORECORMON kansızlığı olan birçok kişiye yardımcı olur, ancak, birkaç kişide istenmeyen yan etkileri görülebilir.

Tüm ilaçların yan etkileri olabilir. Bunlar kimi zaman ciddidir, çoğu zaman değildir. Yan etkilerin tedavisi için tıbbi tedaviye gereksinim duyabilirsiniz.

**Olabilecek herhangi bir sorunuza yanıtlamasını doktorunuzdan veya eczacınızdan isteyin.**

**Şunlardan herhangi birinin farkına varırsanız ve bunlar sizi**

**endişelendirirse, doktorunuza söyleyin.**

- baş ağrısı
- tansiyonun yükselmesi veya var olan yüksek tansiyonun daha da kötüleşmesi. Belirtiler ani ve bıçak gibi migren benzeri baş ağrılarını içerebilir. Doktorunuz tansiyonunuzu, özellikle terapinin başlangıcında, düzenli olarak ölçecektir.
- daha kolay kanama veya çürüme
- kolların, ayakların veya bacakların şişmesi
- iğne yapılan yerin etrafında acı
- göğüste veya boğazda enfeksiyon, nefes zorluğu, öksürük
- halsizlik
- mide bulanması ve kusma
- idrar çıkarırken acı veya idrar çıkarmada aciliyet ve/veya sıklık
- göğüs ağrısı, nefes darlığı, çift görme, baş dönmesi veya eller ve ayaklarda karıncalanma gibi kalp belirtileri

Özellikle bir enjeksiyondan sonra (çok seyrek olmak koşuluyla) şiddetli alerjik reaksiyon görülebilir. Bu, derhal tedavi edilmelidir. Sıradışı bir hırıltı veya nefes almada güçlük; dilin, yüzün veya boğazın şişmesi veya iğne yapılan yerin etrafında şişme gibi sorunların farkına varırsanız; sersemleme veya baygınlık hissederseniz; veya yere yıkılırsanız doktorunuzla ilişkiye geçin veya en yakın hastanedeki Kaza ve Acil Durum Bölümü'ne gidin.

Özellikle tedavinin başlangıcında (çok seyrek olsa da) grip benzeri belirtiler yaşayabilirsiniz. Bunlar ateşlenme, üşüme, baş ağrısı, kollar ve bacaklarda ağrı, kemik ağrısı ve/veya genel bir kırgınlığı içerebilir. Bu reaksiyonlar genellikle hafiften ılımlı arasındadır ve birkaç saat veya gün içinde geçer.

Bu, tüm olası yan etkilerin tam listesi değildir. Daha dört başı mamur bir liste doktorunuzda veya eczacınızda vardır. Diğerleri kimi

kişilerde meydana gelir ve henüz bilinmeyen yan etkiler de olabilir.

**Kendinizi iyi hissetmemenize neden olan herhangi başka bir şeyin farkına varırsanız, yukardaki listede olmasa bile doktorunuza söyleyin.**

**Bu listede anlamadığımız bir şey varsa doktorunuza veya eczacınıza sorun.**

## NEORECORMON kullandıktan sonra

### Depolama

**Bu ilacı, kullanma zamanı gelinceye kadar daima kartonun içinde, buzdolabında saklayın.** Önceden doldurulmuş şırıngaları paketten çıkarırsanız, iyi bir şekilde kalmayabilirler.

**Önceden doldurulmuş NEORECORMON şırıngalarını buzdolabında 2-8 derece arasında saklayın. Dondurmayın.**

NEORECORMON'u (sadece tek bir sürede) buzdolabının dışında 3 günden az bir zaman, (25 dereceye kadarki) oda sıcaklığında kalmışsa, kullanabilirsiniz.

**NEORECORMON önceden doldurulmuş şırıngalarını ışıktan koruyun.**

**Onları arabada veya pencere eşiklerinde bırakmayın.**

Sıcaklık ve rutubet kimi ilaçlara zarar verebilir.

**NEORECORMON'u küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.**

Bir buzdolabının en üst gözündeki bir kabin içi, NEORECORMON'un depolanması için iyi bir yerdir.

**NEORECORMON önceden doldurulmuş şırıngaları, sadece bir kişinin tek bir defa kullanması içindir.**

Önceden doldurulmuş şırıngalar sadece bir kez kullanılmalı ve geri kalanı, iğneyle birlikte uygun bir kabın içinde atılmalıdır.

### Atılması

**Doktorunuz NEORECORMON kullanmayı durdurmanızı söylerse veya önceden doldurulmuş şırıngaların son kullanma tarihi geçerse, geri kalan önceden doldurulmuş şırıngaları ne yapacağınızı eczacınıza sorun.**

## Ürün tanımlaması

### Mevcutiyet

NEORECORMON önceden doldurulmuş şırıngaları şu etki derecelerinde mevcuttur:

- 1,000 IU/0.3 mL eriyik (6'lık paket),
- 2,000 IU/0.3 mL eriyik (6'lık paket),
- 3,000 IU/0.3 mL eriyik (6'lık paket),
- 4,000 IU/0.3 mL eriyik (6'lık paket),
- 5,000 IU/0.3 mL eriyik (6'lık paket),
- 6,000 IU/0.3 mL eriyik (6'lık paket),
- 10,000 IU/0.6 mL eriyik (6'lık paket),
- 20,000 IU/0.6 mL eriyik (6'lık paket),
- 30,000 IU/0.6 mL eriyik (1'lik paket).

### NEORECORMON önceden doldurulmuş şırıngaları neye benzer

Enjeksiyon için NEORECORMON eriyiği atılabilir cam şırıngalarda saklanır. Eriyik berrak ve renksizdir. Deri altı enjeksiyonuna olanak tanımak için paslanmaz çelikten bir iğne de şırınga ile birlikte verilir.

### İçerikleri

#### Aktif içerik

- epoetin beta (rch) (yeniden birleşici insan eritropoietini)

#### Aktif olmayan içerik

Önceden doldurulmuş her şırınga ayrıca şunları içerir:

- üre
- sodyum klorid
- sodyum fosfat – tekbazlı

- sodyum fosfat – çift bazlı
- kalsiyum klorid
- emülsiyonlaştırıcı 20
- glisin
- lösin
- isoleucine
- threonine
- glutamik asit
- fenilalanin

## Sponsor

Roche Products Pty Limited  
ABN 70 000 132 865  
4 - 10 Inman Road  
Dee Why NSW 2099

Müşteri soruları: 1 800 233 950

Lütfen en son Tüketici İlaç Bilgilerini eczacınızdan kontrol edin.

Avustralya Sicil Numaraları:  
1,000 IU/0.3 mL AUST R 104258  
2,000 IU/0.3 mL AUST R 104262  
3,000 IU/0.3 mL AUST R 104263  
4,000 IU/0.3 mL AUST R 104264  
5,000 IU/0.3 mL AUST R 104265  
6,000 IU/0.3 mL AUST R 104266  
10,000 IU/0.6 mL AUST R 104267  
20,000 IU/0.6 mL AUST R 104268  
30,000 IU/0.6 mL AUST R 104269  
Bu broşür 17 Temmuz 2007'de hazırlanmıştır.

---

## Daha fazla bilgi

---

# P.I.N.K Kayıt Formu

---

Hasta Bilgilendirme NeoRecormon Dosyası ( P.I.N.K ) programı, kendilerine NeoRecormon verilen hastalar için sağlanan bir hizmettir. Eğitimsel bir internet sitesi ve ilacı kendi kendine vermede yardımcı olmak üzere keskin maddeler kabı, bezler ve serin tutucu torbalar gibi pratik maddeler içerir.

Bu programa kaydolmak için sadece bu formu doldurun ve şu adrese postalayın:

P.I.N.K. Program  
PO Box 1207  
Brookvale NSW 2100

---

### Hasta Bilgileri

Ünvan

Ad

Soyad

Posta Adresi

Posta Kodu

NeoRecormon'a başladığı tarih:

Reçeteyi Veren Doktorun Adı:

Roche, kişisel bilgilerinizi P.I.N.K Programı'na katılabilmemiz için bu kayıt formunda toplamaktadır. Kişisel bilgileriniz, sadece bu hizmetin yönetilebilmesi için acentalarınıza verilebilir. Kişisel bilgileriniz başkalarına açıklanmayacaktır. Sunduğunuz bilgilerin herhangi bir bölümünü gözden geçirmek veya değiştirmek için lütfen PO Box 1207, Brookvale, NSW 2100 adresine yazın.