

# NEORECORMON®

Có chứa thành phần hoạt tính epoetin beta (rch) [nội tiết tố tổng hợp]

## Thông Tin Về Thuốc Dành Cho Người Tiêu Dùng

### Tờ thông tin này có nội dung gì

Tờ thông tin này trả lời một số câu thường hỏi về thuốc NEORECORMON®.

Nó không bao gồm tất cả các thông tin hiện có về thuốc. Nó không thay thế được cho việc nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Tất cả các loại thuốc đều có những rủi ro và ích lợi. Bác sĩ của bạn đã cân nhắc các rủi ro khi sử dụng thuốc NEORECORMON với những ích lợi mà họ hy vọng thuốc sẽ mang lại cho bạn.

**Nếu bạn có bất cứ băn khoăn nào về việc dùng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của mình.**

**Hãy giữ tờ thông tin này cùng với thuốc.**

Có thể bạn sẽ cần đọc lại nó.

### Thuốc NEORECORMON được dùng để làm gì

NEORECORMON có chứa thành phần hoạt tính epoetin beta (được đọc là e-pau-tin bi-ta). Epoetin beta còn được gọi là nội tiết tố tổng hợp (erythropoietin – được đọc là e-rith-rau-poi-tin).

NEORECORMON thuộc một nhóm thuốc gọi là nội tiết tố.

NEORECORMON tương tự như một trong những nội tiết tố do thận tiết ra tự nhiên (và một phần nhỏ do gan tiết ra) kích thích sự sản sinh ra hồng cầu trong tủy xương và trong lá lách.

NEORECORMON có tác dụng tăng sản lượng hồng cầu và được sử dụng trong việc điều trị các dạng bệnh thiếu máu khác nhau.

Bệnh thiếu máu là tình trạng cơ thể không sản sinh đủ hồng cầu.

Bệnh thiếu máu có thể xảy ra nếu một người bị tổn thương thận hoặc suy thận. Cũng có những trường hợp người có thận hoạt động bình thường nhưng có thể vẫn bị bệnh thiếu máu (chẳng hạn như bệnh nhân đang điều trị hóa liệu pháp). NEORECORMON có thể hữu dụng trong những trường hợp này.

NEORECORMON cũng được sử dụng khi máu của chính bệnh nhân được lấy ra và lưu trữ trước khi đại phẫu nhằm phục vụ cho việc truyền máu. Điều này có nghĩa là người bệnh sẽ không cần phải chấp nhận việc truyền máu lấy từ ngân hàng máu.

Tuy nhiên, có thể bác sĩ của bạn đã kê đơn thuốc NEORECORMON vì một lý do khác.

**Hãy hỏi bác sĩ của mình nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về lý do tại sao thuốc NEORECORMON lại được kê cho bạn.**

NEORECORMON không gây nghiện.

Thuốc này chỉ có theo đơn thuốc của bác sĩ.

### Trước khi bạn dùng NEORECORMON

#### **Khi nào bạn không được dùng thuốc**

**Không được dùng thuốc NEORECORMON nếu:**

- bạn từng có phản ứng dị ứng với epoetin beta hoặc với bất kỳ thành phần nào được liệt kê ở cuối tờ thông tin này. Các triệu chứng của phản ứng dị ứng bao gồm sưng tấy, ngứa

ngáy, phát ban ngứa hoặc khó thở.

- bạn bị huyết áp cao chưa được kiểm soát

- bạn hoặc con nhỏ của mình bị chứng phenylketonuria (bệnh chuyển hóa di truyền) NEORECORMON có chứa **đung chất** phenylalanine và bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về những rủi ro.

- bạn đang lấy máu của chính mình ra để trữ sẵn trước khi phẫu thuật, và:

- bạn bị cơn đau tim hoặc đột quỵ trong tháng trước khi điều trị, hoặc

- bạn bị cơn đau ngực mới hoặc đau ngực ngày càng tăng, hoặc

- bạn có nguy cơ bị máu vón cục trong tĩnh mạch (deep vein thrombosis) hoặc bạn đã từng bị máu vón cục.

Nếu bất cứ tình trạng nào trên đây xảy ra hoặc có thể xảy ra với bạn, hãy nói ngay cho bác sĩ biết.

- bao bì thuốc bị rách hoặc có dấu hiệu đã bị mở ra.

- hạn sử dụng (EXP) in trên bao bì đã hết.

Nếu bạn dùng thuốc này sau khi hạn sử dụng đã hết, có thể nó không còn công hiệu nữa, hoặc tệ hơn nữa là bị phản ứng không lường trước được.

**Nếu bạn không chắc mình có nên dùng thuốc NEORECORMON hay không, hãy nói chuyện với bác sĩ.**

#### **Dùng thuốc cho trẻ em**

NEORECORMON an toàn cho trẻ em sử dụng, kể cả trẻ sơ sinh thiếu tháng.

## **Trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc**

Bác sĩ phải biết tất cả những điều dưới đây trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc NEORECORMON.

### **Hãy cho bác sĩ biết nếu:**

- bạn có thai hoặc dự định có thai. Thông thường không nên dùng NEORECORMON cho phụ nữ có thai trừ phi các ích lợi của việc điều trị bằng thuốc này vượt trội so với những rủi ro cho thai nhi.
- bạn đang cho con bú hoặc dự định cho con bú. Do epoetin beta sinh ra tự nhiên trong cơ thể, người ta vẫn chưa thể xác định được liệu thuốc NEORECORMON sau khi chích có ngấm vào sữa mẹ hay không. Bác sĩ sẽ thảo luận về những rủi ro và ích lợi của việc dùng NEORECORMON nếu bạn đang cho con bú.
- bạn có bất kì vấn đề về sức khỏe nào khác bao gồm:
  - bệnh máu đông cục
  - huyết áp cao – Việc tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ là rất quan trọng nhằm kiểm soát huyết áp của bạn, bao gồm cả những hạn chế về ăn uống
  - ung thư
  - động kinh
  - bệnh thận
  - bệnh gan
  - bất kì bệnh hoặc vấn đề về sức khỏe nào khác. Một số tình trạng như là thiếu vitamin có thể ảnh hưởng tới khả năng cơ thể bạn thích ứng với thuốc NEORECORMON.
- bạn bị dị ứng với bất kì loại thuốc nào khác, hoặc với thức ăn, phẩm nhuộm hay chất bảo quản.

## **Dùng các loại thuốc khác**

**Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng bất kì thứ thuốc nào khác bao gồm bất kì thuốc nào bạn mua từ tiệm thuốc tây, siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm sức khỏe.**

Một số thuốc có thể can thiệp vào và làm ảnh hưởng tới công hiệu của thuốc NEORECORMON.

Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn có nhiều thông tin hơn về những loại thuốc phải cẩn trọng hoặc tránh khi đang dùng NEORECORMON.

---

## **Cách dùng thuốc NEORECORMON**

---

### **Hãy thận trọng tuân thủ tất cả những chỉ dẫn của bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ dành cho bạn.**

Những chỉ dẫn đó có thể khác với thông tin ghi trong tờ này.

### **Liều lượng thuốc chích**

Bác sĩ sẽ cho bạn biết cần chích bao nhiêu thuốc NEORECORMON phù hợp với nhu cầu cá nhân bạn.

Nếu cần thiết, bác sĩ có thể thay đổi liều dùng của bạn trong quá trình trị liệu tùy theo phản ứng của cơ thể bạn.

Bác sĩ sẽ theo dõi phản ứng của bạn với thuốc NEORECORMON bằng cách đặt câu hỏi và đôi khi tiến hành các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

### **Không được tăng hoặc thay đổi liều lượng đã được bác sĩ chỉ dẫn.**

### **Cách chích thuốc**

NEORECORMON được sử dụng bằng cách chích dưới da hoặc chích vào tĩnh mạch.

Bác sĩ có thể thảo luận với bạn để xem liệu việc để bạn tự chích tại nhà có thuận tiện cho bạn hơn không; trong trường hợp đó bạn hoặc người nhà sẽ được hướng dẫn chích thuốc đúng cách. Đây là một qui trình đơn giản và rất nhiều bệnh nhân thích cách này hơn.

Nếu bác sĩ đã yêu cầu bạn dùng NEORECORMON bằng cách chích dưới da, xin vui lòng tuân theo chỉ dẫn dưới đây.

Nếu bác sĩ đã quyết định cho bạn dùng thuốc NEORECORMON bằng cách chích vào tĩnh mạch, bạn sẽ được y tá chích cho trong suốt thời gian thâm tách.

Hiện đã có bộ dụng cụ hỗ trợ nhằm giúp bệnh nhân tự chích thuốc NEORECORMON cho mình. Xin vui lòng dùng mẫu đơn ở cuối tờ thông tin này để đăng kí hoặc muốn biết thêm thông tin xin liên lạc với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc với dịch vụ Thông Tin Y Khoa của Roche (1800 233 950).

Bạn nên để bác sĩ hoặc y tá chích liều thuốc NEORECORMON đầu tiên cho mình.

### **Hướng dẫn cách chích thuốc dưới da**

Hướng dẫn dưới đây chỉ dành cho chích thuốc dưới da.

Bạn nên đọc hướng dẫn này từ đầu tới cuối trước khi bắt đầu để quen với mỗi bước của qui trình thực hiện. Hướng dẫn này phải được tuân theo cẩn. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn cần thêm hướng dẫn.

Xin nhớ rằng vệ sinh sạch sẽ là vô cùng quan trọng.

### **Chuẩn bị tự chích**

Trước khi bạn bắt đầu

1. Rửa tay thật kỹ.
2. Tìm một chỗ sạch sẽ, thoải mái.
3. Tập hợp sẵn tất cả vật dụng thuốc men bạn sẽ cần đến:
  - Một miếng gạc tẩm cồn.
  - Một ít bông gòn.
  - Một hộp bỏ đồ sắc.
4. Lấy xylanh có chứa sẵn thuốc NEORECORMON ra khỏi tủ lạnh. Để ngoài tủ lạnh 30 phút trước khi dùng; hoặc nhẹ nhàng sưởi ấm xylanh giữa hai lòng bàn tay trong khoảng 1 phút. Cẩn thận không được lắc thuốc.
5. Kiểm tra hạn sử dụng (EXP). Không được dùng thuốc NEORECORMON sau hạn sử dụng ghi trên nhãn xylanh.
6. Kiểm tra để biết chất lỏng không bị đổi màu, không có vẩn đục hoặc tạp chất. Chất lỏng phải nhìn trong và không có màu.

### **Chuẩn bị xy lanh và kim chích**

7. Bóc lớp bọc bảo vệ khỏi hộp đựng kim chích.
8. Tháo nắp cao su ở đầu xy lanh ra.
9. Lắp chặt kim chích vào đầu xy lanh.
10. Tháo nắp bảo vệ ở đầu kim ra.
11. Nếu bạn thấy có bọt khí ở trong xy lanh, hãy giữ xy lanh với mũi kim hướng lên trên, gõ nhẹ vào xy lanh để đẩy bọt khí lên trên đầu xy lanh. Có thể bạn cần phải ấn nhẹ piston vào một chút để đẩy khí ra khỏi xy lanh.
12. Kiểm tra liều dùng thuốc mà bác sĩ đã kê. Có thể bạn cần phải ấn nhẹ piston để đẩy bớt thuốc ra để giữ đúng liều mà bác sĩ đã kê.
13. Nếu bạn cần đặt xy lanh (vẫn còn gắn kim chích) xuống, phải đảm bảo là đóng nắp nhựa vào lại kim chích và đặt trên mặt phẳng sạch sẽ.
14. Bày giờ xy lanh đã sẵn sàng để dùng.

### **Chọn chỗ chích thuốc**

15. Chọn một chỗ chích thuốc ở vùng bụng hoặc phần đùi trên.
16. Tránh lỗ rốn và đường vòng eo.
17. Thay đổi chỗ chích mỗi lần nhằm tránh bị đau ở một chỗ.
18. Không bao giờ chích vào vùng bị đỏ hoặc sưng.
19. Không bao giờ chích thuốc NEORECORMON vào bắp thịt.

### **Chuẩn bị chỗ chích thuốc**

20. Lau sạch chỗ chích bằng miếng gạc tẩm cồn và để cho da khô (10 giây)
21. Tháo nắp bảo vệ kim ra khỏi đầu xy lanh và giữ xy lanh với mũi kim hướng lên trên.
22. Bấu chặt da nơi chích thuốc vào giữa ngón cái và ngón trỏ để nâng chỗ da đó lên.

### **Chích thuốc**

23. Giữ xy lanh ở một góc 45 độ so với da.

24. Chọc mũi kim vào bằng một động tác nhanh với đầu xy lanh (cạnh phẳng) hướng lên trên.
25. Từ từ ấn piston xuống đến tận cùng.
26. Khi tất cả chất lỏng đã ra khỏi xy lanh, rút kim ra ở cùng một góc nghiêng như lúc chọc vào.
27. Không đóng nắp trở lại vào đầu kim.
28. Nếu bạn thấy hơi chảy máu, dùng một ít bông gòn thấm nhẹ lên chỗ chích.

Ghi nhớ: Hầu hết mọi người đều có thể học cách tự tiêm dưới da cho mình, nhưng nếu bạn gặp khó khăn, xin đừng ngại xin sự giúp đỡ và lời khuyên từ bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của bạn.

### **Vệ sinh sau khi chích thuốc**

29. Chỉ được dùng kim và xy lanh **một lần**.
30. Bỏ xy lanh và kim (liền một khối) vào hộp chứa đồ sắc ngay sau khi chích thuốc xong.
31. Không lắp lại nắp bảo vệ vào đầu kim.
32. **Không bao giờ** bỏ kim và xy lanh đã sử dụng vào thùng rác thông thường của gia đình.

Nếu bạn không rõ cách vứt bỏ xy lanh và kim chích như thế nào, hãy hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ về cách vứt bỏ xy lanh và kim chích đúng cách.

### **Khi nào chích thuốc NEORECORMON**

Bác sĩ sẽ cho bạn biết bao lâu thì dùng thuốc này một lần.

**Làm đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ về thời gian chích thuốc NEORECORMON.**

### **Dùng NEORECORMON trong bao lâu**

Thời gian điều trị của bạn có thể từ vài tuần tới suốt đời, tùy theo bệnh tình của bạn.

**Tiếp tục dùng NEORECORMON cho đến khi bác sĩ bảo bạn ngưng dùng.**

Bác sĩ sẽ quyết định khi nào thì dùng việc điều trị của bạn.

### **Nếu quý vị quên dùng thuốc NEORECORMON**

**Nếu đã sắp đến giờ chích thuốc, bạn hãy bỏ qua lần bị quên và thực hiện lần chích tiếp theo khi đến giờ đã định. Hoặc là bạn vẫn cứ dùng thuốc ngay khi bạn nhớ ra, rồi sau đó trở lại dùng thuốc như thường lệ.**

**Không được chích thuốc gấp đôi để bù cho lần bạn quên.**

Vì thuốc NEORECORMON được sử dụng trong những khoảng thời gian dài, việc thỉnh thoảng quên không dùng thuốc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc điều trị của bạn.

**Nếu bạn không biết chắc phải làm gì, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của mình.**

**Nếu bạn thấy khó nhớ khi nào phải dùng thuốc, hãy hỏi dược sĩ cách ghi nhớ.**

### **Nếu bạn dùng quá nhiều thuốc NEORECORMON (quá liều)**

**Gọi điện ngay cho bác sĩ hoặc Trung Tâm Thông Tin về Độc (điện thoại 13 11 26) để được chỉ dẫn hoặc tới phòng Tai Nạn và Cấp Cứu ở bệnh viện gần nhất nếu bạn cho rằng mình hoặc bất kì ai khác có thể đã dùng quá nhiều thuốc NEORECORMON, ngay cả khi không có dấu hiệu bất ổn hoặc ngộ độc. Bạn có thể cần trợ giúp y tế khẩn cấp.**

**Hãy giữ số điện thoại của những nơi này sao cho tiện dụng.**

### **Trong khi đang dùng thuốc NEORECORMON**

#### **Những điều bạn phải làm**

**Dùng NEORECORMON đúng như bác sĩ đã kê đơn.**

**Nói cho tất cả bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ đang điều trị cho bạn biết là bạn đang dùng thuốc NEORECORMON.**

**Không được dùng bất kì thứ thuốc nào khác, cho dù chúng cần phải có toa của bác sĩ hay không, khi chưa hỏi bác sĩ hoặc tham vấn dược sĩ trước.**

Nếu bạn có vấn đề về huyết áp, điều quan trọng là phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ nhằm kiểm soát huyết áp của bạn, bao gồm cả các hạn chế về ăn uống, trong khi đang dùng thuốc NEORECORMON.

Nồng độ sắt trong máu của hầu hết mọi người giảm đi khi dùng thuốc NEORECORMON. Hầu hết bệnh nhân sẽ cần được điều trị bổ sung thêm chất sắt.

**Nói cho bác sĩ biết nếu bạn có thai trong khi đang dùng thuốc NEORECORMON.**

**Nói cho bác sĩ biết nếu, vì bất cứ lý do gì, bạn đã không dùng thuốc NEORECORMON đúng như toa của bác sĩ.**

Nếu không, có thể bác sĩ nghĩ rằng thuốc không công hiệu và đổi cách chữa trị một cách không cần thiết.

**Hãy đảm bảo là bạn tới tất cả các cuộc hẹn gặp bác sĩ để bác sĩ có thể theo dõi tiến triển của bạn.**

Bác sĩ sẽ cần phải làm xét nghiệm máu cho bạn thường xuyên.

### **Những điều bạn không được làm**

**Không được ngưng dùng thuốc NEORECORMON hoặc thay đổi liều dùng mà không hỏi bác sĩ trước.**

**Không được để hết thuốc vào cuối tuần hoặc trong kì nghỉ.**

**Không được đưa thuốc NEORECORMON cho bất kì ai khác cho dù họ cũng có tình trạng giống như bạn.**

**Không được dùng thuốc NEORECORMON để điều trị các bệnh khác trừ phi bác sĩ của bạn cho phép.**

**Không được đổi sang dùng epoetin của nhãn hiệu khác mà không tham vấn bác sĩ trước.**

### **Những điều cần thận trọng**

**Thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc cho đến khi bạn biết thuốc NEORECORMON ảnh hưởng tới bạn ra sao.**

---

## **Tác dụng phụ**

---

**Nói cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn càng sớm càng tốt nếu bạn thấy không khỏe trong khi đang dùng thuốc NEORECORMON.**

NEORECORMON hỗ trợ hầu hết những người bị bệnh thiếu máu nhưng nó có thể có tác dụng phụ không mong muốn ở một số người.

Tất cả các loại thuốc đều có thể có tác dụng phụ. Đôi khi chúng nghiêm trọng, nhưng thường thì không. Bạn có thể cần được điều trị y tế nếu gặp phải một số tác dụng phụ nào đó.

**Nếu có thắc mắc gì xin hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ.**

**Nói cho bác sĩ biết nếu bạn thấy bất kì dấu hiệu nào dưới đây và chúng khiến bạn lo lắng:**

- đau đầu
- huyết áp tăng hoặc tình trạng huyết áp vốn đã cao nay lại càng xấu đi. Các triệu chứng có thể bao gồm các cơn đau nhói đầu bất chợt, giống như bệnh thiên đầu thống. Bác sĩ sẽ thường xuyên kiểm tra huyết áp của bạn, đặc biệt là ở giai đoạn đầu trị liệu.
- dễ bị chảy máu hoặc bầm tím hơn
- sưng cánh tay, bàn chân hoặc cẳng chân
- đau nhói quanh chỗ chích thuốc
- viêm ngực hoặc viêm họng, khó thở, ho
- yếu mệt
- buồn nôn và ói mửa
- đau khi đi tiểu hoặc mức độ gấp gáp và/hoặc thường xuyên của việc đi tiểu tăng lên
- Các triệu chứng về tim như đau ngực, hơi thở ngắn, sưng tay, chóng mặt hoặc ngứa ran ở bàn tay và bàn chân

chóng mặt hoặc ngứa ran ở bàn tay và bàn chân

Một phản ứng dị ứng nghiêm trọng (rất hiếm) có thể xảy ra, đặc biệt là ngay sau khi chích thuốc. Tình trạng này phải được điều trị ngay lập tức. Nếu bạn thấy tiếng khò khè bất thường hoặc khó thở; sưng lưỡi, mặt hoặc cổ họng, hoặc sưng quanh chỗ chích thuốc; nếu bạn thấy đầu nhẹ hoặc muốn xỉu; hoặc nếu bạn quy, hãy liên lạc với bác sĩ hoặc tới phòng Tai Nạn và Cấp Cứu ở bệnh viện gần nhất.

Bạn có thể gặp các triệu chứng kiểu như cúm (rất hiếm), đặc biệt là khi bắt đầu điều trị. Các triệu chứng này bao gồm sốt, cảm giác lạnh, đau đầu, đau trong tứ chi, đau xương và/hoặc cảm giác không khỏe thông thường. Những phản ứng này thường nhẹ cho tới vừa phải và sẽ hết trong vòng vài giờ hoặc vài ngày.

Đây không phải là danh mục đầy đủ tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra. Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn sẽ có danh sách đầy đủ hơn. Các tác dụng phụ khác có thể xảy ra ở một số người và cũng có một số tác dụng phụ chưa được biết tới.

**Nói cho bác sĩ biết nếu bạn thấy bất kì điều gì khác khiến bạn cảm thấy không khỏe, cho dù nó không nằm trong danh sách trên.**

**Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không hiểu bất kì điều gì trong danh sách này.**

---

## **Sau khi dùng thuốc NEORECORMON**

---

### **Cất giữ thuốc**

**Luôn luôn giữ thuốc này trong hộp các-tông và cất trong tủ lạnh cho tới lúc dùng đến nó**  
Nếu bạn lấy các ống xylanh có chứa thuốc ra khỏi hộp, có thể chúng không giữ được tốt.

**Cất giữ các ống xylanh chứa thuốc NEORECORMON trong tủ lạnh ở nhiệt độ 2-8 độ C. không được làm đông lạnh.**

Bạn có thể dùng NEORECORMON nếu nó được lấy ra khỏi tủ lạnh chưa quá 3 ngày (chỉ trong một lần

duy nhất mà thôi) ở nhiệt độ trong phòng (tối đa 25 độ C)

**Tránh không để ống xylanh chứa NEORECORMON ra ánh sáng.**

**Không được để thuốc trong xe hoặc trên ngưỡng cửa sổ.**

Hơi nóng và ẩm ướt có thể làm hỏng một số thuốc.

**Đề thuốc NEORECORMON ở nơi trẻ nhỏ không với tới được.**

Tốt nhất là nên bỏ thuốc vào trong hộp thích hợp và cất ở ngăn trên cùng của tủ lạnh.

**Mỗi ống xylanh chứa thuốc NEORECORMON chỉ dùng một lần cho một người mà thôi.**

Ống thuốc chỉ được dùng một lần và lượng thuốc còn dư lại cùng với kim chích phải được vứt bỏ vào trong hộp chứa thích hợp.

**Vứt bỏ thuốc**

**Nếu bác sĩ yêu cầu bạn ngưng dùng thuốc NEORECORMON, hoặc ống xylanh chứa thuốc đã hết hạn sử dụng, hãy hỏi dược sĩ xem bạn phải làm gì với những ống thuốc còn dư lại.**

---

## Mô tả sản phẩm

---

### Dạng sản phẩm lưu hành

Các ống xylanh chứa sẵn thuốc NEORECORMON có các nồng độ sau đây:

- Dung dịch 1000 IU/0,3 mL (hộp 6 ống),
- Dung dịch 2000 IU/0,3 mL (hộp 6 ống),
- Dung dịch 3000 IU/0,3 mL (hộp 6 ống),
- Dung dịch 4000 IU/0,3 mL (hộp 6 ống),
- Dung dịch 5000 IU/0,3 mL (hộp 6 ống),
- Dung dịch 6000 IU/0,3 mL (hộp 6 ống),
- Dung dịch 10000 IU/0,6 mL (hộp 6 ống),
- Dung dịch 20000 IU/0,6 mL (hộp 6 ống),
- Dung dịch 30000 IU/0,6 mL (hộp 1 ống).

## **Ống xylanh chứa thuốc NEORECORMON trông như thế nào**

Dung dịch NEORECORMON dùng để chích được chứa trong xylanh thủy tinh có thể vứt bỏ được. Dung dịch này trong suốt và không màu. Kèm theo xylanh là một kim chích bằng thép không rỉ dùng để chích thuốc dưới da.

## **Thành phần**

### **Thành phần hoạt tính**

- epoetin beta (rch) (nội tiết tố tổng hợp)

### **Các thành phần khác**

Mỗi ống xylanh thuốc còn có:

- urê
- clorua natri
- photphat natri – monobasic
- photphat natri – dibasic
- clorua canxi
- polysorbate 20
- glycine
- leucine
- isoleucine
- threonine
- axit glutamic
- phenylalanine

---

## Nhà tài trợ

---

Roche Products Pty Limited  
ABN 70 000 132 865  
4 - 10 Inman Road  
Dee Why NSW 2099

Đường dây giải đáp thắc mắc của khách hàng: 1 800 233 950

Xin vui lòng hỏi dược sĩ để có tờ Thông Tin Về Thuốc Dành Cho Người Tiêu Dùng mới nhất.

Số Đăng Kí tại Úc:

1,000 IU/0.3 mL AUST R 104258  
2,000 IU/0.3 mL AUST R 104262  
3,000 IU/0.3 mL AUST R 104263  
4,000 IU/0.3 mL AUST R 104264  
5,000 IU/0.3 mL AUST R 104265  
6,000 IU/0.3 mL AUST R 104266  
10,000 IU/0.6 mL AUST R 104267  
20,000 IU/0.6 mL AUST R 104268  
30,000 IU/0.6 mL AUST R 104269

Tờ thông tin này được soạn thảo ngày 17 tháng 7 năm 2007.

---

## Thông tin thêm

---

# Đơn tham gia chương trình P.I.N.K

---

Chương trình Bộ Thông Tin Về Thuốc NeoRecormon Dành Cho Bệnh Nhân ( P.I.N.K ) là một dịch vụ được cung cấp cho những bệnh nhân đã được kê toa thuốc NeoRecormon. Nó bao gồm một trang mạng có tính giáo dục và các vật dụng như một hộp chứa đồ sắc, những miếng gạc và những túi mát để hỗ trợ việc tự sử dụng thuốc.

Để tham gia vào chương trình này chỉ cần điền vào tờ đơn này và gửi thư tới:

P.I.N.K. Program  
PO Box 1207  
Brookvale NSW 2100

---

### Thông tin về bệnh nhân

Danh hiệu
Tên
Họ
Địa chỉ thư tín
Mã bưu điện

Ngày bắt đầu dùng thuốc NeoRecormon:

Tên thầy thuốc kê toa:

Roche thu thập thông tin cá nhân của bạn trong tờ đơn này để bạn có thể tham gia chương trình P.I.N.K. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho các đại lý của chúng tôi nhằm mục đích duy nhất là thực hiện dịch vụ này. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kì ai khác. Nếu bạn muốn xem lại hoặc sửa đổi bất kì phần thông tin nào mà bạn đã nộp, xin vui lòng viết thư tới P.I.N.K. program, PO Box 1207, Brookvale, NSW 2100.